

香港腸胃內視鏡中心

檢查流程

到接待處進行登記

醫護人員會向病人核對個人資料，填寫檢查問卷，講解檢查過程和簽署同意書

如有需要，可先去洗手間

到更衣室換上檢查衣服

把個人物品擺放在儲物櫃

病人躺在手術床上後，醫護人員為病人帶上測量血壓、脈搏及含氧量的儀器

醫生或護士會為病人注射鎮靜劑及止痛劑，然後進行檢查

檢查後，醫護人員會運送病人到復甦室觀察及休息

待病人清醒後，醫生會解釋檢查結果，然後安排離開中心

香港腸胃內視鏡中心

地點便利

香港腸胃內視鏡中心佔地全層四千呎，配備先進的上消化道及大腸內視鏡儀器，採取嚴謹的消毒程序，整個過程均由資深的腸胃內科或外科專科醫生及註冊護士主理，提供一個寬敞、舒適的環境及優質、專業和安全的檢查服務。



*港鐵尖沙咀站A2出口堪富利士道
或尖東站N2出口河內道

如有任何查詢，請致電香港腸胃內視鏡中心

 (852) 2366 1268

九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心18樓
傳真：(852) 2366 9811



Hong Kong
Gastrointestinal
Endoscopy Centre
香港腸胃內視鏡中心



結直腸內視鏡

(大腸鏡) 檢查

結直腸內視鏡(大腸鏡)檢查



- 大腸鏡檢查所用的光導纖維喉管是一條柔軟、細小(直徑約1.1厘米)且可彎曲的管子，前端設有微形攝錄機。
- 檢查時，醫生會小心將內視鏡從病人肛門引入至整條大腸；透過同步視像檢查，可診斷大腸內壁有否異常或病變。
- 如有瘻肉、潰瘍或腫瘤，醫生會使用輔助儀器進行瘻肉切除，止血或抽取病變組織作進一步化驗。

何時需要接受大腸鏡檢查

- 大便持續帶血或黏液
- 大便習慣改變(如便秘、腹瀉)
- 排便不清
- 缺鐵性貧血
- 腹痛或腹部有腫塊
- 曾患腸瘻肉或直系親屬曾患結腸癌之人仕，可定期作大腸鏡檢查
- 一般人可在45歲左右接受第一次檢查以監測有否長有瘻肉



檢查前準備

- 檢查前三天：避免高纖維食物：瓜，荳，蔬菜，水果等；可以進食粥，粉，麵，飯，魚及肉類。
- 檢查前一晚或當天：服用醫生處方的瀉藥，清潔腸道。
- 檢查前六小時開始禁食。
- 如對藥物有敏感，服食糖尿藥、薄血丸或亞士匹靈等藥物的人仕，應預先通知醫生，醫生或會建議病人在檢查前暫停服用某些藥物。
- 檢查前病人須除去眼鏡，飾物，金屬物品及假牙等；隱形眼鏡配帶者須自備盛載器以確保個人衛生。



檢查後注意事項

- 病人完全清醒後，在一般情況下，可以恢復正常飲食。
- 由於檢查過程中會注入氣體使腸道膨脹，以便提升檢查準確度；所以檢查後會有輕微腹部氣脹及頻頻放屁，但情況會慢慢消失。
- 病人需由家人或親友陪同離開中心。
- 檢查後24小時內切勿飲酒，駕駛車輛，操作器械或簽署重要文件。



檢查過程

- 檢查時，病人要向左側臥以及屈曲雙腿。
- 醫護人員會按醫生處方予病人注射鎮靜劑和止痛劑，檢查會在熟睡的情況下進行。
- 檢查時會有儀器監察病人的血壓，心跳和血含氧量。
- 檢查過程約需15分鐘至45分鐘。
- 檢查完成後，醫護人員會運送病人到復甦室休息，並會密切監察病人情況；病人一般會在半小時至一小時後完全清醒。



併發症

- 因割除瘻肉而導致腸壁穿破的機會少於二千份之一。
- 抽取組織或割除瘻肉的地方可能引起輕微出血，但一般會自動止血，機率为百份之二。



檢查結果

檢查完畢後，醫生會向病人解釋結果；如有組織須要化驗，一般可在幾天內知道化驗結果，醫生會另作安排解釋報告。

