

# 香港腸胃內視鏡中心

## 檢查流程

到接待處進行登記

醫護人員會向病人核對個人資料，填寫檢查問卷，講解檢查過程和簽署同意書

如有需要，可先去洗手間

到更衣室換上檢查衣服

把個人物品擺放在儲物櫃

病人躺在手術床上後，醫護人員為病人帶上測量血壓、脈搏及含氧量的儀器

醫生或護士會為病人注射鎮靜劑及止痛劑，然後進行檢查

檢查後，醫護人員會運送病人到復甦室觀察及休息

待病人清醒後，醫生會解釋檢查結果，然後安排離開中心

# 香港腸胃內視鏡中心

## 地點便利

香港腸胃內視鏡中心佔地全層四千呎，配備先進的上消化道及大腸內視鏡儀器，採取嚴謹的消毒程序，整個過程均由資深的腸胃內科或外科專科醫生及註冊護士主理，提供一個寬敞、舒適的環境及優質、專業和安全的檢查服務。



\*港鐵尖沙咀站A2出口堪富利士道  
或尖東站N2出口河內道

如有任何查詢，請致電香港腸胃內視鏡中心

 (852) 2366 1268

九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心18樓  
傳真：(852) 2366 9811



上  
消  
化  
道  
內  
視  
鏡  
（胃鏡）檢查

## 上消化道內視鏡(胃鏡)檢查



- 胃鏡檢查所用的光導纖維喉管是一條柔軟、細小(直徑約0.8厘米)且可彎曲的管子，前端設有微形攝錄機。
- 檢查時，醫生會將內視鏡從病人口腔經過喉部進入食道、胃及十二指腸部位，透過同步視像檢查，可診斷上消化道有否異常或病變。
- 醫生可使用輔助儀器在檢查時同時進行瘻肉切除，止血或抽取病變組織作進一步化驗，亦會抽取胃組織測試幽門螺旋菌，因幽門螺旋菌乃引致胃，十二指腸潰瘍及胃癌的主要原因。

## 何時需要接受胃鏡檢查

- 胃痛
- 貧血
- 吞嚥困難
- 持續嘔吐
- 胃酸倒流或胸口有灼熱感覺
- 上腹部持續不適或有腫塊
- 上消化道出血(嘔吐物帶血或糞便呈黑色)



## 檢查前準備

- 檢查前六小時禁食。
- 如對藥物有敏感，服食糖尿病藥、薄血丸或亞士匹靈等藥物的人仕，應預先通知醫生，醫生或會建議病人在檢查前暫停服用某些藥物。
- 檢查前病人須除去眼鏡、飾物、金屬物品及假牙等。隱形眼鏡配帶者須自備盛載器以確保個人衛生。



## 檢查後注意事項

- 待完全清醒後及喉部麻醉藥效力消失後，可以恢復正常飲食。
- 檢查後會有輕微胃氣脹，但情況會慢慢消失。
- 病人需由家人或親友陪同離開中心。
- 檢查後24小時內切勿飲酒，駕駛車輛，操作器械或簽署重要文件。



## 檢查過程

- 檢查時，病人要向左側臥。
- 醫護人員會在病人的喉部噴上局部麻醉藥，然後請病人口含膠牙墊。
- 醫護人員會按醫生處方予病人注射鎮靜劑和止痛劑，檢查會在熟睡的情況下進行。
- 檢查時會有儀器監察病人的血壓，心跳和血含氧量。
- 檢查過程約需10分鐘至20分鐘。
- 檢查完成後，醫護人員會運送病人到復甦室休息，並會密切監察病人情況，病人一般會在半小時至一小時後完全清醒。



## 檢查結果

檢查完畢後，醫生會向病人解釋結果；如有組織須要化驗，一般可在幾天內知道化驗結果，醫生會另作安排解釋報告。

